
VASCULARITES SUJET AGE Quoi de neuf

H orton	41 %	Toujours autant	d'aveugles d'AVC de morts
		Eclairer l'occulte	
<u>Vascularites</u>			
<u>cutanées</u>	21 %	A côté du médicament, de l'infection, chercher l'hémopathie	
Micropolyangéite			
<u>microscopique</u>		9.4 % Une insuffisance rénale rapide cl vieillard qui tousse	
		S'il y a des P-Anca, c'er	ı est une!
Wegener	3.4 %	Des gâteries pour le gériatre	
PAN	0.8 %		
Churg et Strauss	0.8 %		







VASCULARITES CUTANEES

ENFANT < 20 ans	ADULTE
10 %	40 %
88 %	22 %
_	6.4 %
	10 %
	2 %
	1.2 %
	6.4 %
0.5 %	2.3 %
	1.2 %
	2.3 %
	2.9 %
	10 % 88 % - - -



VASCULARITES CUTANEES

PURPURA

palpable, extrémités inférieures vascularite leucocytoclasique


Urticaire fixe

Livedo

Ulcères

Nécroses acrales





VASCULARITES CUTANEES

Biopsie indispensable

[malheur à l'interne qui repousse à lundi...!]


Nécrose fibrinoïde média

+ nécrose périvasculaire

Angéites nécrosantes = Rares – graves

Vascularites leucocytoclasiques
Sans nécrose

Angéites localisées Fréquentes - bénignes





VASCULARITE HYPERSENSIBILITE

BENIN

Secondaire à médicaments ou infection Syndrome cutanéo-articulaire Pronostic excellent

Martinez-Taboada V.H. Am J Med 1997;102:186-91

Possible precipitating events in 95 patients with hypersensitivity vasculitis

Unidentified	38 patients
Drugs	43 "
antibiotics	29
β lactamics	13
analgesic/NSAIDs	7
diuretics	2
others	7
unknown	6
Infections	35
upper respiratory tract infection	19
localized infection	3
unknown	13
Others	9
hepatitis	5
intravenous drug abusers	3
chronic hepatopathy	2

SELECTED FEATURES IN 95 PATIENTS WITH HYPERSENSITIVITY VASCULITIS

Extracutaneous involvement Joint symptoms 65.3 **Nephropathy** 7.4 Gastrointestinal involvement 5.4 Laboratory findings **Increased ESR** 69.4 Anemia 5.5 Rheumatoid factor + 13.5 Antinuclear antibodies 15.7 Low C3-C4 2.8

Therapy and course in 95 patients with hypersensitivity vasculitis

number of cases

	Hulling of Cases
Therapy	
no treatment	54
NSAIDs	26
corticosteroids	14
immunosuppressive ager	nts 2
Course	
mean follow-up (months)	15.5. ± 28.9
lost for follow-up	15
recurrent episodes	23
slight renal impairment	2
complete recovery	78

..... BEWARE! VASCULARITE LEUCOCYTOCLASIQUE APRES 60 ANS

VASCULARITES PARANEOPLASIQUES

- restreintes à la peau
- nécrose fibrinoïde [type PAN]
- précédent affection maligne : 50 %
 Beylot J, Rev Med Int 1989

VASCULARITES – AFFECTIONS MALIGNES

Blanco 1998 Gonzales-Gay 1999

Etude personnelle 2002

lge

34.4

≥ 50

≥ 70

Iémopathies

Jalignes

2.3 %

3 %

25 %

VASCULARITES - NEOPLASIES

Beylot J, Rev Med Int 1989;6:509-14 Bourantas K, Ann Intern Med 1984;121:942-4

HEMOPATHIES

TUMEURS SOLIDES

• leucémies tricholeucocytes	++++
 myélodysplasies 	+++
 lymphomes non hodgkiniens 	++
Hodgkin	+
 Leucémies myélomonocytaires aiguës 	+
 Leucémies myéloblastiques 	+

(+)